

# ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Νίνα Τριανταφυλλίδου, Κωνσταντίνα Σελιώνη, Γεώργιος Καφαλίδης, Σουλτάνα Γεώργα, Ζλάτκα Νικητάκη,  
Διονύσιος Καρακαϊδός, Παρασκευή Ζώση  
Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

**Εισαγωγή:** Η δηλητηρίαση από κατάποση καπνικών προϊόντων αποτελεί ένα από τα συχνότερα παιδικά ατυχήματα. Αιτίες είναι η υπερβολική ζωηράδα των παιδιών και η μίμηση των γονέων. Τα συμπτώματα δηλητηρίασης από νικοτίνη μπορεί να αφορούν σε όλα τα συστήματα και είναι έμετος, ταχυκαρδία, δυσκολία στην αναπνοή, σπασμοί ανάλογα με την προσλαμβανόμενη δόση. Σε όλες τις περιπτώσεις, γίνονται πλύσεις και χορηγείται ενεργός άνθρακας. Οι ασθενείς με απώλεια συνείδησης πρέπει να διασωληνωθούν και να τους παρασχεθεί υποστηρικτική θεραπεία σε ΜΕΘ.

**Σκοπός:** Διερεύνηση συχνότητας νοσηλείας παιδιών με δηλητηρίαση από κατάποση καπνικών προϊόντων.

**Υλικό:** 280 νοσηλευόμενα παιδιά με δηλητηρίαση από κατάποση καπνικών προϊόντων την περίοδο Ιανουάριος 2000- Ιούνιος 2020

**Μέθοδος:** Χρήση στοιχείων των βιβλίων εισαγωγών στην Κλινική μας την περίοδο Ιανουάριος 2000- Ιούνιος 2020

**Αποτελέσματα:** Το μικρότερο σε ηλικία παιδί που νοσηλεύθηκε ήταν 6 μηνών και το μεγαλύτερο 5,5 ετών και ο μέσος όρος 17,2 μηνών. Το 70,3% των παιδιών ήταν ηλικίας 13 μηνών έως 6 ετών και το 29,2% ηλικίας 6 μηνών έως 12 μηνών. Το 53,6% ήταν αγόρια και 46,4% κορίτσια. Το 84,3% ήταν ελληνικής εθνικότητας, το 8,6% ανήκε σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και 7,1% ήταν αλλοδαποί. Σε όλα τα παιδιά, έγιναν πλύσεις στομάχου και χορηγήθηκε ενεργός άνθρακας κατόπιν οδηγιών του Κέντρου Δηλητηριάσεων. Το 94,3% νοσηλεύθηκε για 1 ημέρα και κανένα δεν εμφάνισε κάποια ανεπιθύμητη παρενέργεια .

# ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Νίνα Τριανταφυλλίδου, Κωνσταντίνα Σελιώνη, Γεώργιος Καφαλίδης, Σουλτάνα Γεώργα, Ζλάτκα Νικητάκη, Διονύσιος Καρακαϊδός, Παρασκευή Ζώση  
Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

**Συμπεράσματα:** Η δηλητηρίαση από καπνό παρατηρήθηκε κυρίως σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Το καλύτερο αντίδοτο στις δηλητηριάσεις είναι η πρόληψη. Οι παιδίατροι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του Κέντρου Δηλητηριάσεων και να είναι σε εγρήγορση για τυχόν εμφάνιση ανεπιθύμητων παρενεργειών.

