

ΑΑ078: ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ

Σοφία Στεφανάκη¹, Παναγιώτα Σπυρομήτρου-Ξιούφη¹, Αγγελική Τζαγκαράκη¹, Ευαγγελία Λιαδάκη¹, Κλεάνθη Βουτσαδάκη¹, Μαρία Ανατολιωτάκη¹, Γεωργία Βλαχάκη¹.

1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο", Ηράκλειο Κρήτης



Σκοπός

- Παρουσίαση βρέφους 3 μηνών με σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς που διαπιστώθηκε σε τυχαίο έλεγχο.



Εισαγωγή

- Ανεπάρκεια μιτροειδούς: η πιο κοινή βαλβιδική νόσος στους ενήλικες.
- Πολύ σπάνια στα παιδιά
- Συχνότητα 0,2-0,4% όλων των συγγενών καρδιοπαθειών.
- Η συγγενώς ανώμαλη κατασκευή της μιτροειδούς μπορεί να οδηγήσει σε στένωση, ανεπάρκεια βαλβίδας ή και τα δύο.
- Η ανεπάρκεια είναι συχνά μέτριας σοβαρότητας τα πρώτα χρόνια ζωής
- 1:2 ασθενείς με ανεπάρκεια θα χειρουργηθούν μετά την ηλικία των 5 ετών.

Υλικό-Μέθοδος

- Βρέφος 3 μηνών, με άριστη σωματική ανάπτυξη.
- Ελεύθερο ατομικό-οικογενειακό ιστορικό.
- Παραπέμπεται από παιδίατρο λόγω ήπιου συστολικού φυσήματος στο Παιδοκαρδιολογικό ιατρείο του Νοσοκομείου μας.
- Στο διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα διαπιστώθηκε μεγάλη διάταση των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων και ανεπάρκεια μιτροειδούς σοβαρού βαθμού
- Χωρίς ευρήματα στένωσης ή άλλη συγγενή καρδιοπάθεια.

ΑΑ078: ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ

Σοφία Στεφανάκη¹, Παναγιώτα Σπυρομήτρου-Ξιούφη¹, Αγγελική Τζαγκαράκη¹, Ευαγγελία Λιαδάκη¹, Κλεάνθη Βουτσαδάκη¹, Μαρία Ανατολιωτάκη¹, Γεωργία Βλαχάκη¹.

1. Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο", Ηράκλειο Κρήτης



Αποτελέσματα

- Διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος για πιθανή διατακτική μυοκαρδιοπάθεια.
- Υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος των γονέων: δεν ανέδειξε παθολογία.
- Τέθηκε σε αγωγή με: φουροσεμίδη-σπειρονολακτόνη-καπτοπρίλη-καρβεδιλόλη
- Παραπέμφθηκε σε Παιδοκαρδιολογικό κέντρο των Αθηνών για αποκλεισμό ανώμαλης έκφυσης στεφανιαίων αρτηριών.
- Αποκλείστηκε μετά από στεφανιογραφία.

Αποτελέσματα

- Η διάταση των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων, ιδίως της αριστερής κοιλίας υποχώρησε στο επόμενο χρονικό διάστημα.
- Παρέμεινε η σοβαρή ανεπάρκεια της μιτροειδούς.
- Διεκόπη η αγωγή με καρβεδιλόλη, συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα φάρμακα.
- Το βρέφος παραμένει με φυσιολογική ανάπτυξη, χωρίς σημεία καρδιακής κάμψης.

Συμπέρασμα

- Η συγγενής ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι σπάνια στα παιδιά.
- Αλλά υπάρχει και πρέπει να μπαίνει στη διαφοροδιάγνωση.
- Βρέφη ασυμπτωματικά με ήπια ευρήματα στην εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος μπορεί να υποκρύπτουν σοβαρή καρδιολογική πάθηση.
- Είναι χρήσιμη η εκτίμησή τους από ειδικό.

