

ΑΑ088: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟ 2019 ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2020

Ελένη Γιάννη¹, Νότου Αγγέλα², Τατιάνα Τουμαγγέλοβα Πουλτσάκη³

1.3η ΤΟΜΥ Αθήνας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

2.Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο

3.Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Εισαγωγή: Τα παιδιά 6 μηνών-5 χρονών που παρακολουθούν βρεφονηπιακό σταθμό εκδηλώνουν συχνά λοιμώξεις. Η στενή & παρατεταμένη επαφή μεταξύ τους ευνοεί την ανάπτυξη & μετάδοση λοιμώξεων. Οι παιδικές αρρώστιες έχουν μειωθεί στο ελάχιστο λόγω των εμβολιασμών. Πλέον το κοινό κρουολόγημα, οι γαστρεντερίτιδες, οι λοιμώξεις του δέρματος & επιπεφυκώτων είναι οι συχνότερες μεταδιδόμενες λοιμώξεις σε βρεφονηπιακό σταθμό. Φέτος η ευαισθητοποίηση όλων των ενηλίκων λόγω της πανδημίας σε θέματα υγιεινής-ατομικής προστασίας επέφερε σημαντική μείωση των λοιμώξεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς τον μήνα Ιούνιο. Επακόλουθο ήταν η εύρυθμη-δημιουργική λειτουργία τους.

Σκοπός: Η ανάδειξη της σημαντικότητας της ενημέρωσης-εκπαίδευσης των γονέων στους κανόνες υγιεινής και τα μέτρα ατομικής προστασίας και η συνεισφορά τους στα μέτρα που λαμβάνει κάθε παιδικός σταθμός στην αναχαίτηση των λοιμώξεων.

Υλικό: Κλινικά ευρήματα από την μηνιαία παιδιατρική εκτίμηση σε 400 βρέφη-νήπια 4 παιδικών σταθμών στην Αττική τις περιόδους Ιούνιο2019 και Ιούνιο2020 (επί πανδημίας κορονοϊού).

Μέθοδος: Απλή καταγραφή και σύγκριση των ευρημάτων στις 2 περιόδους

Συμπεράσματα:

- Η σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής-μέτρων ατομικής προστασίας μέσα και έξω από το σπίτι συνεισέφερε στην σημαντική πτώση των λοιμώξεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς τον Ιούνιο 2020.
- Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να απολαμβάνουν μια ευχάριστη-αποδοτική παραμονή σε αυτά και οι γονείς να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερο άγχος για την υγεία των παιδιών και τις χαμένες εργατοώρες.
- Τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των παιδιάρων στην ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων ως προς αυτήν την κατεύθυνση.

| Λοίμωξη | Ιούνιος 2019 | Ιούνιος 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ανώτερου αναπνευστικού (ρινίτιδα, ωτίτιδα, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα) | 205(50%) | 4(1%) |
| Γαστρεντερικού (έμετοι-διάρροιες) | 16 | 0 |
| Δέρματος | 16 | 1 |
| Επιπεφυκώτων | 16 | 0 |