

ΑΑ114:ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Αριάδνη Νεοφύτου¹, Ζαμπία Γλυνιαδάκη², Βασιλική-Τσιέκο Μελικόκη³, Βασιλική Πατταεαγγέλου⁴

1. Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, Πύργος Ηλείας

2. 1^η ΤΟ.Μ.Υ. Χανίων, Χανιά Κρήτης

3. Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο Νοσοκομείο», Πειραιάς

4. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού σε κάθε κύηση συστήνεται 1 δόση εμβολίου έναντι γρίπης και κοκκύτη.

ΣΚΟΠΟΣ

Η αποτύπωση των γνώσεων, των στάσεων και των πρακτικών ανάμεσα σε έγκυες γυναίκες σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι γρίπης και κοκκύτη.


ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ

Ανώνυμα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε έγκυες γυναίκες σε τρεις Δημόσιες Μονάδες Υγείας (Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο Νοσοκομείο», το Κέντρο Υγείας Πύργου Ηλείας και το Κέντρο Υγείας Χανίων).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επιστράφηκαν συνολικά 205 ερωτηματολόγια.

ΤΜΗΜΑ Α – ΓΝΩΣΕΙΣ



ΑΑ114:ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Αριάδνη Νεοφύτου¹, Ζαμπία Γλυνιαδάκη², Βασιλική-Τσιέκο Μελικόκη³, Βασιλική Πατταεωαγγέλου⁴


1. Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, Πύργος Ηλείας

2. 1^η ΤΟ.Μ.Υ. Χανίων, Χανιά Κρήτης

3. Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο Νοσοκομείο», Πειραιάς

4. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΤΜΗΜΑ Β – ΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ



ΤΜΗΜΑ Γ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

	Όχι N(%)	Ναι N(%)
Σκοπεύετε να εμβολιαστείτε/εμβολιαστήκατε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εγκυμοσύνης έναντι της γρίπης;	149(72,7%)	56(27,3%)
Σκοπεύετε να εμβολιαστείτε/εμβολιαστήκατε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εγκυμοσύνης έναντι του κοκκύτη;	189(92,2%)	16(7,8%)
Νιώθετε πως χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;	41(20,0%)	164(80,0%)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ	Γρίπη N(%)	Κοκκύτη N(%)
	Δεν νιώθω πως βρίσκομαι σε κίνδυνο.	23(17,2%)
Το εμβόλιο μπορεί να βλάψει την υγεία μου	7(5,2%)	3(1,8%)
Το εμβόλιο μπορεί να είναι επικίνδυνο για το έμβρυο	26(19,4%)	21(12,7%)
Το εμβόλιο δεν είναι χρήσιμο	2(1,5%)	2(1,2%)
Ο γιατρός δεν μου το σύστησε	103(76,9%)	139(83,7%)
Άλλη αιτία	6(4,5%)	3(1,8%)

ΑΑ114:ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Αριάδνη Νεοφύτου¹, Ζαμπία Γλυνιαδάκη², Βασιλική-Τσιέκο Μελικόκη³, Βασιλική Παπαευαγγέλου⁴

1. Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, Πύργος Ηλείας

2. 1^η ΤΟ.Μ.Υ. Χανίων, Χανιά Κρήτης

3. Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο Νοσοκομείο», Πειραιάς

4. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα, οι γνώσεις των εγκύων γυναικών για τη γρίπη και τον κοκκύτη είναι ανεπαρκείς και τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης έναντι των νοσημάτων αυτών είναι πολύ χαμηλά. Κύρια αιτιολογία μη εμβολιασμού διαφαίνεται η απουσία σύστασης από τον γιατρό. Από μελέτη ανασκόπησης της βιβλιογραφίας για την κατανόηση των εμποδίων αποδοχής του μητρικού εμβολιασμού, προκύπτει ότι η σύσταση από τους επαγγελματίες υγείας αποτελεί το πιο ισχυρό κίνητρο αποδοχής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 1.Lutz CS et al. Vaccine. 2018 Nov 26;36(49):7445-7455
- 2.Caroline D'Heilly et al. [Infect Dis Ther](#). 2019 Sep 17
- 3.Gkentzi D et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017;102:F456-F463
- 4.Vojtek et al. ANNALS OF MEDICINE, 2018 VOL. 50, NO. 3, 193-208
5. Amirthalingam G et al. Clin Infect Dis. 2016;63:S236-S243.
6. Sakala IG et al. Hum Vaccin Immunother. 2016;12:3065-3071
- 7.World Health Organization. Wkly Epidemiol Rec. 2012;87:461-476.
8. ACOG committee opinion. Obstet Gynecol 2018;131(6):1188-91.
- 9.Sperling RS et al. Obstet Gynecol 2018;131(5):799-802.
- 10.Megan C. Lindley et al. MMWR. October 11, 2019 / Vol. 68 / No. 40