

# ΑΑ120 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ:ΚΟΡΙΤΣΙ 13 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ

Κωνσταντίνα Χατζηεμμανουήλ MD,Μαγδαληνή Κορεξενίδου MD, Αναστασία Παπαγεωργίου MD, Δήμητρα Κυριλλίδη MD, Ιωάννα-Σοφία Ψαρράκου MD, Msc, Ιουλία Μπουλογιάννη MD, Ηλίας Κοσμάς MD, Κωνσταντίνος Κλειτσάκης MD

1.Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, Γ.Ν.Λαμίας

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Σταφυλοκοκκικό αποφολιδωτικό σύνδρομο (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome-SSSS) παρατηρείται, κυρίως, σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών και εκδηλώνεται με πυρετό, ευερεθιστότητα και καθολικό οστρακοειδές εξάνθημα που μπορεί να εμφανιστεί και με φυσαλίδες και ακολουθείται από εκτεταμένη απολέπιση.

## ΣΚΟΠΟΣ

Η περιγραφή περιστατικού θήλεος 13 μηνών το οποίο παρουσίασε σταφυλοκοκκικό αποφολιδωτικό σύνδρομο χωρίς να εμφανίσει πυρετό.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κορίτσι 13 μηνών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων λόγω έκχυσης διάχυτου εξανθήματος σε κορμό, άκρα, βουβώνες και πρόσωπο από 3ημέρου. Το παιδί αρχικά εμφάνισε ήπιο οίδημα και ερυθρότητα βλεφάρων. Ακολούθησε έκχυση ερυθματώδους μικροκλιδώδους εξανθήματος στη μηρογεννητική περιοχή με σταδιακή επέκτασή στο υπόλοιπο σώμα (κορμό και άκρα). Κατόπιν, παρουσίασε μελιτόχρες δερματικές βλάβες πέριξ της ρινός και επιπεφυκίτιδα άμφω. Προηγήθηκε προ 9ώρου η εισαγωγή-κατανάλωση μελιού. Λάμβανε αντισταμινική αγωγή από ιδιώτη παιδίατρο.

Ελήφθησαν καλλιέργεια φαρυγγικού εκκρίματος και δερματικής βλάβης, από τις οποίες η πρώτη ήταν αρνητική ενώ από την δεύτερη απομονώθηκε Staphylococcus aureus.

Η μικρή ασθενής αντιμετωπίστηκε άμεσα με ενδοφλέβια αντισταφυλοκοκκική αγωγή και τοπική αντιμικροβιακή αγωγή στους οφθαλμούς και στις δερματικές βλάβες. Παρουσίασε σταδιακή βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νόσου το παιδί παρέμεινε άπυρετο και αιμοδυναμικά σταθερό.



**Εικόνα 1.** Οίδημα και ερυθρότητα βλεφάρων με συνοδά επιπεφυκίτιδα



**Εικόνα 2.** Μελιτόχρες δερματικές βλάβες περιξ τις ρινός και των ρινοπαραριακών πτυχών



**Εικόνα 3.** Ερυθματώδες μικροκλιδώδες εξάνθημα κορμού

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Σταφυλοκοκκικό αποφολιδωτικό σύνδρομο αποτελεί μια κλινική οντότητα που πρέπει ο παιδίατρος να την περιλαμβάνει στη διαφοροδιάγνωση του διάχυτου, οστρακοειδούς εξανθήματος ακόμη και στη περίπτωση που ΔΕ συνοδεύεται με πυρετική κίνηση

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Berk, D.R. and S.J. Bayliss.(2010).“MRSA, staphylococcal scalded skin syndrome, and other cutaneous bacterial emergencies.”Pediatr Ann 39(10):627-633
- Handler,M.Z.andR.A.Schwartz(2014).“Staphylococcal scalded skin syndrome: diagnosis and management in children and adults. ”J Eur Acad Dermatol Venereol28(11):1418-1423
- Jordan,K.S.(2019)“Staphylococcal Scalded Skin Syndrome:A Pediatric Dermatological Emergency.”Adv Emerg Nurs J 41(2):129-134